

Návod na použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
rajče	zvýšení odolnosti rostlin	2 – 3 % (200–300 ml/10 / vody) 200 – 300 ml /10 / vody / 100 m ²	1	2) mšice, molice, svlušky, třásněnky 3) max. 5 x
okrasné rostliny	zvýšení odolnosti rostlin	2 – 3 % (200–300 ml/10 / vody) 200 – 300 ml /10 / vody / 100 m ²	1	2) mšice, molice, svlušky, třásněnky, červci 3) max. 5 x
paprika	zvýšení odolnosti rostlin	2 – 3 % (200–300 ml/10 / vody) 200 – 300 ml /10 / vody / 100 m ²	1	2) mšice, molice, svlušky, třásněnky 3) max. 5 x
okurka	zvýšení odolnosti rostlin	2 – 3 % (200–300 ml/10 / vody) 200 – 300 ml /10 / vody / 100 m ²	1	2) mšice, molice, svlušky, třásněnky 3) max. 5 x
tykev	zvýšení odolnosti rostlin	2 – 3 % (200–300 ml/10 / vody) 200 – 300 ml /10 / vody / 100 m ²	1	2) mšice, molice, svlušky, třásněnky 3) max. 5 x
bob	zvýšení odolnosti rostlin	2 – 3 % (200–300 ml/10 / vody) 200 – 300 ml /10 / vody / 100 m ²	1	2) mšice, třásněnky 3) max. 5 x
jádroviny	zvýšení odolnosti rostlin	3 % 300 ml /10 / vody / 100 m ²	1	3) přezimující škůdci, od poč. rašení do zel. poupěte max. 1x
peckoviny	zvýšení odolnosti rostlin	3 % 300 ml /10 / vody / 100 m ²	1	3) přezimující škůdci, při rašení, max. 1x
jádroviny, peckoviny	zvýšení odolnosti rostlin	2-3 % 300 ml /10 / vody / 100 m ²	1	3) mšice, svlušky, při výskytu, max. 5x
réva vinná	zvýšení odolnosti rostlin	3 % 300 ml /10 / vody / 100 m ²	1	3) přezimující škůdci, při rašení, max. 1x
angrešt, rybíz	zvýšení odolnosti rostlin	2 – 3 % 200 – 300 ml /10 / vody / 100 m ²	1	3) mšice, při výskytu, max. 5x
mimo velmi mladé rostliny				
jehličnany	zvýšení odolnosti rostlin	2 – 3 % 200 – 300 ml /10 / vody / 100 m ²	1	3) korovnice, při výskytu, max. 5 x
mimo velmi mladé rostliny				
chmel	zvýšení odolnosti rostlin	2 % (20-40 / 1000-2000 / vody / ha, podle vzrůstu chmele	1	2) mšice, svlušky, při výskytu, max. 5x
mimo velmi mladé rostliny				

Ochranná lhůta představuje nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní (rajče, paprika, okurka, tykev, bob, angrešt, rybíz, jádroviny, peckoviny, réva vinná a chmel) nebo manipulací s porostem (okrasné rostliny, jehličnany).

Aplikace postřikem nebo rosením.

Pokud je použita koncentrace, postřik či rosení ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí aplikační kapaliny z povrchu ošetřovaných částí rostlin. Před použitím si přečtěte příložený návod k použití.

Riziko, které představuje pomocný prostředek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s pomocným prostředkem nepřesáhne 30 minut během jednoho dne.

Aplikační poznámky:

Pomocný prostředek ROCK EFFECT je určen pro zvýšení odolnosti a obrany-schopnosti rostlin vůči škůdcům. Vzhledem k tomu, že se jedná o produkt na přírodní bázi, tak zákal či malá usazenina není na závadu a neovlivní účinnost prostředku.

Nižší koncentrace aplikační kapaliny v rámci uvedeného rozmezí jsou vhodné pro mladší rostliny, vyšší koncentrace pro starší rostliny. Pomocný prostředek aplikujte na listy rostlin postřikem nebo rosením ze vzdálenosti min. 30 cm. ROCK EFFECT působí kontaktně, proto je pro dobrou účinnost nutné ošetřit části rostlin, kde se škůdci nachází (i rub listů rostlin). Pro optimální účinnost je nutné aplikovat při zjištění prvního výskytu škůdců. Pokud je použita koncentrace, postřik či rosení ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí aplikační kapaliny z povrchu ošetřovaných částí rostlin. Vyvarujte se nadměrnému zvlhčení rostliny. Vyhněte se aplikaci za prudkého slunce. Nedoporučujeme použití pomocného prostředku na velmi mladé rostliny. Před použitím se doporučuje pomocný prostředek vyzkoušet na menším počtu ošetřovaných rostlin. Ošetření lze opakovat ve venkovním prostředí po smytí ochranného filmu z rostliny deštěm nebo rosou až 5 x, v krytém prostředí po odeznění účinnosti maximálně 1 x. Při použití proti korovnicím je vhodné pro dosažení optimální účinnosti aplikaci do týdne zopakovat.

Mírný pohyb nádrže při aplikaci udržuje emulzi aplikační kapaliny stále stabilní. V případě nepohyblivosti aplikační kapaliny v nádrži postřikovače po dobu 30 minut, (například při odložení začátku aplikace) je fyzikální stabilita emulze na úrovni 99 % její počáteční hodnoty. Po této době doporučujeme s obsahem nádrže lehce zamíchat.